

LE RETOUR DES FRELONS ...

Le mot du gérant

Afin de garder un contact régulier avec nos clients et de les informer des évolutions de notre métier, l'équipe STH a décidé de mettre en place cette newsletter.

Pour le secteur 3D elle vous permettra d'être informé sur les nouveaux produits disponible et sur les méthodes de luttés contre les nuisibles.

Dans ce premier numéro, nous avons choisi de vous parler du « Frelon Asiatique », véritable fléau, dont les premières fondatrices vont commencer à se montrer.

Bien sûr nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.

Bonne lecture !

MECHIN Max



DERATISATION

DESINSECTISATION

DESINFECTION

HOTTE / VMC

Piégeage de pigeons

**SERVICE TECHNIQUE
D'HYGIENE**

4 rue Guillaume Lekeu -
ANGERS

www.sth-angers.com

Mise en ligne le 15 février 2019

Frelons asiatiques : cycle de vie et méthodes de lutte

Avant la construction du nid

La fin de l'hiver annonce le retour du frelon asiatique. C'est en effet à partir des premières douceurs de février ($>13^{\circ}\text{C}$) que les premières fondatrices vont faire leur apparition.

Chaque fondatrice va construire sa propre colonie : construction des alvéoles du nid et pontes (1 œuf par jour). Elle sera seule à s'occuper de nourrir les larves jusqu'à ce qu'elles deviennent nymphes puis des adultes ouvrières (environ 45 jours). Durant cette période, la fondatrice passe la plupart de son temps à l'extérieur du nid : c'est le moment idéal pour commencer à piéger (environ du 15 février au 1^{er} mai).



La solution STH :



Un piège écologique à suspendre à l'extérieur piégera les fondatrices avant qu'elles n'aient construit leur nid. Une fondatrice piégée c'est un nid de frelon asiatique en moins.

Le liquide guêp'clac est non-chimique et cible exclusivement les frelons, guêpes et mouches (il n'attire ni les abeilles ni les bourdons).

Naissance des ouvrières

Une fois les premiers œufs devenu adultes ouvrières, la fondatrice ne quittera plus le nid. Elle pourra pondre jusqu'à 100 œufs par jour jusqu'à son épuisement, aux environs de l'automne. La femelle fondatrice ne vit qu'une année.

Aux premiers grands froids, les nouvelles fondatrices quittent le nid pour trouver une cachette pour l'hiver. Le reste de la colonie mourra de faim et de froid.

En moyenne, si rien n'est fait, le nombre de nid est multiplié par 5 l'année suivante.



La solution STH :

Depuis l'année dernière, STH intervient sur les nids de frelons asiatiques au paintball.


Des billes d'insecticides sont tirées directement dans le nid de frelons. Au contact de la structure du nid, la bille explose (la membrane de la bille est écologique) et l'insecticide va se répandre. L'agitation des frelons dans le nid va également faciliter la diffusion du produit.

La colonie va mourir et le nid se dégradera avec les intempéries.

Cette méthode, très efficace, permet un gain financier à nos clients (pas de location de nacelle).



Certaines mairies prennent en charge tout ou partie de la facture pour la destruction de nid de frelons asiatiques. Pensez donc à leur demander !



Société déclarée auprès
du Ministère de l'Environnement

T.V.A. : FR08387540057

Siège : 4 rue Guillaume Lekeu | 49100 ANGERS | Tél: 02.41.43.22.36 | Fax: 02.41.43.07.00 | contact@sth-angers.fr
Antenne : SAINT JEAN DE LIVERSAY | 17000 LA ROCHELLE
SARL au capital de 95 200 € | RCS 387540057 - 92B353 | SIRET 38754005700040